Стодаль®: Инструкция по применению

Содержание

- Состав
- Фармакологическое действие
- Фармакодинамика
- Показания
- Противопоказания
- Применение при беременности и кормлении грудью
- Побочные действия
- Взаимодействие
- Способ применения и дозы
- Передозировка
- Особые указания
- Форма выпуска
- Производитель
- Условия отпуска из аптек
- Условия хранения
- Срок годности

Фармакологическая группа

- Гомеопатическое средство [Гомеопатические средства]

Нозологическая классификация (МКБ-10)

- R05 Кашель

Состав

Сироп гомеопатический	**100 г**
активные вещества:	
Pulsatilla (пульсатилла) С6	0,95 г
Rumex crispus (румекс криспус) С6	0,95 г
Bryonia (бриония) С3	0,95 г
Ipeca (ипека) С3	0,95 г
Spongia tosta (спонгия тоста) С3	0,95 г
Sticta pulmonaria (стикта пульмонария) С3	0,95 г
Antimonium tartaricum (антимониум тартарикум) С6	0,95 г
Myocarde (миокардэ) С6	0,95 г
Coccus cacti (коккус какти) С3	0,95 г
Drosera (дрозера) МТ	0,95 г
вспомогательные вещества: сироп Толу — 19 г; сироп Полигала — 19 г; этанол 96% — 0,34 г; карамель — 0,125 г; бензойная кислота — 0,085 г; сироп сахарозы — до 100 г	

Приведенная научная информация является обобщающей
и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Описание лекарственной формы

Прозрачный сироп светло-желтого с коричневатым оттенком цвета, с ароматным запахом.

Фармакологическое действие

Фармакологическое действие - гомеопатическое.

Фармакодинамика

Многокомпонентное гомеопатическое средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания препарата Стодаль®

Симптоматическое лечение кашля различной этиологии.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Необходима консультация врача. При применении следует учитывать, что каждые 15 мл сиропа содержат 0,206 г этанола, каждые 5 мл — 0,069 г этанола.

Побочные действия

На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Взаимодействие

В настоящее время данные о взаимодействии с другими ЛС отсутствуют. Прием препарата не исключает лечения другими ЛС.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым: по 15 мл с помощью мерного колпачка 3–5 раз в день. Детям: по 5 мл с помощью мерного колпачка 3–5 раз в день. Длительность применения следует согласовать с врачом.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Приведенная научная информация является обобщающей
и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Особые указания

Если после нескольких дней лечения не отмечено никаких улучшений, необходимо проконсультироваться с врачом.

Пациентам, страдающим сахарным диабетом, следует учитывать, что каждые 15 мл сиропа содержат 0,94 ХЕ, каждые 5 мл — 0,31 ХЕ.

Влияние на способность управлять автомобилем или выполнять работы, требующие повышенной скорости физических и психических реакций. Не влияет.

Форма выпуска

Сироп гомеопатический. По 200 мл препарата во флаконе коричневого стекла типа III (Европейская фармакопея) с белой завинчивающейся крышкой из пластика и герметичного кольца, обеспечивающего контроль первого вскрытия, и мерным колпачком, надетым на крышку. Каждый флакон помещают в картонную пачку.

Производитель

Лаборатория Буарон: 20, ул. Либерасьон, 69110 Сент-Фуа-ле-Лион, Франция.

Место производства 2, проспект Уэст Лионнэ, 69510 Мессими, Франция.

Представитель в России/организация, принимающая претензии потребителей: ООО «Буарон», 127006, Москва, ул. Долгоруковская, 7. Бизнес Центр «Садовая Плаза», этаж 11.

Тел.: (495) 956-08-10; факс: (495) 956-08-14.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Условия хранения препарата Стодаль®

В сухом, защищенном от света месте, при температуре 15–25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата Стодаль®

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_7690.htm

Приведенная научная информация является обобщающей
и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.