

Свечи с папаверина гидрохлоридом 0,02 г: Инструкция по применению

Действующее вещество:

- Папаверин (Papaverine)

Содержание

- **Показания**
- Противопоказания
- Применение при беременности и кормлении грудью
- Побочные действия
- Меры предосторожности
- Условия хранения препарата
- Срок годности препарата

АТХ

- A03AD01 Папаверин

Фармакологические группы

- Вазодилататоры
- Спазмолитики миотропные

Показания

Спазм гладких мышц: органов брюшной полости (холецистит, пилороспазм, спастический колит, почечная колика), периферических сосудов (эндартериит), сосудов головного мозга, сердца — стенокардия (в составе комплексной терапии), бронхоспазм; в качестве вспомогательного ЛС для премедикации.

Противопоказания

Гиперчувствительность, АВ блокада, глаукома, тяжелая печеночная недостаточность, пожилой возраст (риск развития гипертермии), детский возраст (до 6 мес).

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность применения при беременности и в период грудного вскармливания не установлена.

Побочные действия

Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): АВ блокада, желудочковая экстрасистолия, понижение АД.

Со стороны органов ЖКТ: запор, повышение активности печеночных трансаминаз.

Прочие: сонливость, эозинофилия, аллергические реакции.

Меры предосторожности

Следует иметь в виду, что эффективность снижается при курении.

Условия хранения препарата

В сухом, прохладном, защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_4920.htm