

# Лизобакт®: Инструкция по применению

## Действующее вещество:

- Лизоцим + Пиридоксин\* (Lysozyme + Pyridoxine\*)

## Содержание

- Состав
- Фармакологическое действие
- Фармакодинамика
- **Показания**
- Противопоказания
- Применение при беременности и кормлении грудью
- Побочные действия
- Взаимодействие
- **Способ применения и дозы**
- Передозировка
- Особые указания
- Форма выпуска
- Производитель
- Условия отпуска из аптек
- Условия хранения
- Срок годности

## АТХ

- R02AA20 Прочие препараты

## Фармакологическая группа

- Антисептическое средство [Антисептики и дезинфицирующие средства в комбинациях]

## Нозологическая классификация (МКБ-10)

- B00.2 Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит
- J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации
- K05 Гингивит и болезни пародонта
- K12 Стоматит и родственные поражения
- K12.0 Рецидивирующие афты полости рта
- K13.7 Другие и неуточненные поражения слизистой оболочки полости рта

## Состав

Таблетки для рассасывания	<b>1 табл.</b>
<i>активные вещества:</i>	

лизоцима гидрохлорид	20 мг
пиридоксина гидрохлорид	10 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> лактоза моногидрат — 155,4 мг; камедь трагакантовая — 10 мг; магния стеарат — 4 мг; натрия сахаринат — 0,5 мг; ванилин — 0,1 мг	

## Описание лекарственной формы

Круглые таблетки белого или белого с желтоватым или кремоватым оттенком цвета, с разделительной риской с одной стороны.

## Фармакологическое действие

*Фармакологическое действие* - антисептическое.

## Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

**Лизоцим** является ферментом белковой природы, применяется как антисептик вследствие его прямого воздействия на грамположительные и грамотрицательные бактерии, а также грибы и вирусы; принимает участие в регуляции местного неспецифического иммунитета.

**Пиридоксин** оказывает защитное действие на слизистую оболочку полости рта (оказывает антиафтозный эффект). Не влияет на фармакодинамические свойства лизоцима.

## Показания препарата Лизобакт®

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта, десен и гортани: гингивит; стоматит; катаральные явления в верхних отделах дыхательных путей; афтозные изъязвления; герпетические поражения (в составе комплексной терапии); эрозии слизистой оболочки полости рта любой этиологии.

## Противопоказания

- гиперчувствительность;
- наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- детский возраст до 3 лет.

## Применение при беременности и кормлении грудью

Лизобакт® может применяться во время беременности и периода кормления грудью.

## Побочные действия

Аллергические реакции.

## Взаимодействие

Препарат Лизобакт® усиливает действие антибиотиков, в т.ч. пенициллина, хлорамфеникола, нитрофурантоина, усиливает действие диуретиков, ослабляет активность леводопы. Изониазид, пеницилламин, пиразинамид, иммуносупрессоры, эстрогены и пероральные контрацептивы могут усиливать потребность в пиридоксине (антагонистическое действие по отношению к пиридоксину или увеличение ренальной экскреции).

## Способ применения и дозы

### Местно.

Таблетки следует медленно рассасывать, не разжевывая, задерживая растаявшую массу таблетки в полости рта как можно дольше, до полного растворения.

Детям в возрасте 3–7 лет обычно назначают по 1 табл. 3 раза в сутки, 7–12 лет — по 1 табл. 4 раза в сутки. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 2 табл. 3–4 раза в сутки.

Курс лечения — 8 дней.

## Передозировка

**Симптомы** передозировки маловероятны, могут отмечаться после применения в дозах, значительно превышающих терапевтические, и проявляются чувством онемения, ощущением покалывания, а также потерей чувствительности в области верхних и нижних конечностей.

**Лечение:** обильное питье (форсированный диурез).

## Особые указания

В случае появления аллергических реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

## Форма выпуска

**Таблетки для рассасывания.** По 10 табл. в блистере из ПВХ/алюминиевой фольги. По 1 или 3 блистера помещают в картонную пачку.

## Производитель

Босналек АО. Сараево, ул. Юкичева, 53, Босния и Герцеговина.

Претензии потребителей направлять в адрес представительства в РФ: 119435, Москва, Большой

Саввинский пер., 11.

Тел./факс: (495) 771-76-32.

[www.bosnalijek-rf.ru](http://www.bosnalijek-rf.ru)

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Условия хранения препарата Лизобакт®**

При температуре 10–30 °С.

*Хранить в недоступном для детей месте.*

### **Срок годности препарата Лизобакт®**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Источник: [http://www.rlsnet.ru/tn\\_index\\_id\\_24402.htm](http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_24402.htm)