

Тержинан: Инструкция по применению

Содержание

- Состав и форма выпуска
- Фармакологическое действие
- **Показания**
- Побочные действия
- **Способ применения и дозы**
- Условия хранения
- Срок годности

АТХ

- G01BA Антибактериальные препараты в комбинации с кортикостероидами

Фармакологическая группа

- Другие противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства в комбинациях

Нозологическая классификация (МКБ-10)

- A59 Трихомоноз
- B37 Кандидоз
- N76 Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы
- Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика

Состав и форма выпуска

1 вагинальная таблетка содержит тернидазола 200 мг, неомицина сульфата 100 мг, нистатина 100000 ЕД и преднизолона метасульфобензоата натрия 3 мг, а также эксципиент, включающий масла герани и гвоздики до 1,2 г; в упаковке 6 и 10 шт.

Фармакологическое действие

Фармакологическое действие - противомикробное, противовоспалительное.

Является трихомонацидом (тернидазол), обладает антибактериальными (неомицин сульфат — антибиотик широкого спектра действия из группы аминогликозидов) и противогрибковыми (нистатин — антибиотик из группы полиенов) свойствами, за счет преднизолона (глюкокортикоид) оказывает противовоспалительный эффект, эксципиенты обеспечивают нормальное функционирование слизистой оболочки влагалища и постоянство pH.

Показания препарата Тержинан

Бактериальные вагиниты, вызванные банальной пиогенной флорой; трихомонадные вагиниты, грибковые вагиниты, вызванные *Candida albicans*; вагиниты, вызванные смешанной инфекцией (трихомонадами, анаэробной инфекцией и дрожжеподобными грибами).

Для профилактики развития инфекций: перед оперативным лечением гинекологических

заболеваний; перед родами или абортом; до и после установки противозачаточной спирали; до и после диатермокоагуляции шейки матки; перед внутриматочными исследованиями (гистерография).

Побочные действия

Кожные аллергические реакции (в отдельных случаях); очень редко — чувство жжения и местное раздражение (в начале лечения).

Способ применения и дозы

По 1 вагинальной табл. перед сном. Таблетку, смочив в воде в течение 20–30 с, глубоко ввести во влагалище, после чего полежать 10–15 мин. Средняя продолжительность непрерывного лечения — 10 дней. В случаях подтвержденного микоза продолжительность лечения должна увеличиться до 20 дней. Во время менструации лечение не прекращать.

Условия хранения препарата Тержинан

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата Тержинан

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_4050.htm