Уголь активированный: Инструкция по применению

Действующее вещество:

- Активированный уголь (Activated charcoal)

Содержание

- Фармакологическое действие
- Условия хранения
- Срок годности

АТХ

- A07BA01 Активированный уголь

Фармакологические группы

- Энтеросорбирующее средство [Детоксицирующие средства, включая антидоты]
- Энтеросорбирующее средство [Адсорбенты]

Нозологическая классификация (МКБ-10)

- A02.9 Сальмонеллезная инфекция неуточненная
- A05.9 Бактериальное пищевое отравление неуточненное
- A09 Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения (дизентерия, диарея бактериальная)
- B19 Вирусный гепатит неуточненный
- E88.9 Нарушение обмена веществ неуточненное
- F10.3 Абстинентное состояние
- J45 Астма
- K29.7 Гастрит неуточненный
- K30 Диспепсия
- K31.8.2* Гиперацидность желудочного сока
- K59.1 Функциональная диарея
- K73.9 Хронический гепатит неуточненный
- K74.6 Другой и неуточненный цирроз печени
- K81.1 Хронический холецистит
- K86.8.2* Холецистопанкреатит
- K94* Диагностика заболеваний ЖКТ
- L20 Атопический дерматит
- N19 Почечная недостаточность неуточненная
- R14 Метеоризм и родственные состояния
- T30 Термические и химические ожоги неуточненной локализации
- T43 Отравление психотропными средствами, не классифицированное в других рубриках
- T46.0 Отравление сердечными гликозидами и препаратами аналогичного действия
- T50.9.0* Отравление алкалоидами
- T53 Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов
- T56.9 Токсическое действие металла неуточненного
- T60.0 Токсическое действие фосфорорганических и карбаматных инсектицидов

Приведенная научная информация является обобщающей
и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

- Z51.0 Курс радиотерапии
- Z51.1 Химиотерапия по поводу новообразования

Фармакологическое действие

Фармакологическое действие - энтеросорбирующее, антидиарейное, дезинтоксикационное.

Условия хранения препарата Уголь активированный

В сухом месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата Уголь активированный

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_5308.htm

Приведенная научная информация является обобщающей
и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.