

Фарингосепт®: Инструкция по применению

Действующее вещество:

- Амбазон* (Ambazone*)

Содержание

- Состав и форма выпуска
- Фармакологическое действие
- Фармакодинамика
- **Показания**
- Противопоказания
- Побочные действия
- Взаимодействие
- **Способ применения и дозы**
- Передозировка
- Особые указания
- Производитель
- Условия хранения
- Срок годности

АТХ

- R02AA01 Амбазон

Фармакологическая группа

- Антисептики и дезинфицирующие средства

Нозологическая классификация (МКБ-10)

- J02.9 Острый фарингит неуточненный
- J03.9 Острый тонзиллит неуточненный (ангина агранулоцитарная)
- J04 Острый ларингит и трахеит
- K05.0 Острый гингивит
- K12 Стоматит и родственные поражения

Состав и форма выпуска

Таблетки для рассасывания	1 табл.
амбазона моногидрат	10 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> какао; сахар (сахароза); лактозы моногидрат; гуммиарабик; поливидон К30; магния стеарат; ванилин	

в блистере 10 шт.; в пачке картонной 1 или 2 блистера.

Таблетки для рассасывания со вкусом лимона	1 табл.
амбазона моногидрат	10 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> какао; сахар (сахароза); лактозы моногидрат; гуммиарабик; поливидон К30; магния стеарат; ароматизатор лимонный	

в блистере 10 шт.; в пачке картонной 1 или 2 блистера.

Описание лекарственной формы

Таблетки для рассасывания: круглые, плоские, скошенные к краю таблетки желтовато-коричневого цвета с немногочисленными вкраплениями более светлого цвета с цельными краями.

Таблетки для рассасывания со вкусом лимона: круглые, плоские, скошенные к краю таблетки желтовато-коричневого цвета с немногочисленными вкраплениями более светлого цвета, с гравировкой «L» с одной стороны.

Фармакологическое действие

Фармакологическое действие - противомикробное, антисептическое, бактериостатическое.

Фармакодинамика

Оказывает местное противомикробное действие. Обладает бактериостатическим действием. Активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (*Streptococcus haemolyticus*, *Streptococcus viridans*, *Pneumococcus*).

Антисептический эффект достигается через 30 мин.

Показания препарата Фарингосепт®

симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (тонзиллит, ларингит, фарингит, гингивит, стоматит);

профилактика инфекций полости рта в периоперационный период (тонзилэктомия, удаление зуба);

профилактика профессионального ларингита.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Побочные действия

Аллергические реакции, кожная сыпь.

Взаимодействие

Не отмечено взаимодействий с другими ЛС.

Способ применения и дозы

Местно. Таблетки следует рассасывать до полного растворения, через 15–30 мин после еды. После применения таблеток в течение 3 ч следует воздерживаться от питья и приема пищи.

Взрослым — по 4–5 табл. (0,04–0,05 г) в сутки.

Детям от 3 до 7 лет — 3 табл. (0,03 г) в сутки. Курс лечения — 3–4 дня.

Передозировка

Случаи передозировки не известны. Антидота для амбазона не существует. В случае применения очень большой дозы рекомендуется индукция рвоты и/или промывание желудка.

Особые указания

Увеличение дозы не оказывает большего клинического эффекта.

Производитель

КО «Терапия АО», Румыния.

Условия хранения препарата Фарингосепт®

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата Фарингосепт®

4 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_3330.htm